

Hecho por Veterinarios

METADOL

METAMIZOL SODICO

¿Dolor, fiebre, inflamación?... **METADOL** ¡es la solución!

Al igual que los seres humanos, nuestras mascotas y otros animales como los caballos o inclusive los bovinos sufren de dolores de cabeza (cefalea), fiebre, dolores post-quirúrgicos y cólicos.

Laboratorio Silvestri pone a su disposición METADOL en forma de jarabe para nuestras mascotas e inyectable para mascotas y otros animales.

METADOL

METAMIZOL SODICO

Potente – Rápido – Eficiente

El Metadol (metamizol sódico) es un antiinflamatorio no esteroideo (AINES) perteneciente al grupo de las pirazolonas que está provisto de marcadas acciones analgésica y antipirética, actividad antiinflamatoria moderada y cierta acción anti-espasmódica.

Su mecanismo de acción es similar al de otros antiinflamatorios no esteroideos e implica la inhibición de la síntesis de prostaglandinas.

El efecto analgésico es comparable al de ciertos narcóticos y se establece a los 20 - 30 minutos después de la administración oral y a los 5 - 15 minutos después de la inyección intramuscular.

INDICACIONES DE USO

Dado sus potentes efectos analgésico y antipirético y su moderada acción antiinflamatoria puede ser usado en los siguientes casos:

1. Fiebre
2. Cefaleas
3. Estados dolorosos del aparato locomotor como artritis agudas y crónicas
4. Reumatismos de músculos y articulaciones
5. Tenosinovitis
6. Neuritis
7. Neuralgias
8. Dolores post-operatorios
9. Cólicos y otros estados espásticos de los órganos abdominales



Hecho por Veterinarios

RECOMENDACIONES DE USO

Metadol Jarabe

1. Vía Oral
2. Dosis: 2,0 ml por cada 10 kg de peso vivo
3. Dosis máxima por animal 5,0 ml equivalentes a 1.250 mg en perros de mas de 25 kg

Metadol Inyectable

1. Vías: Intramuscular, Subcutánea o Intravenosa lenta
2. Perros y Gatos: 0,5 ml a 1,0 ml por cada 10 kg de peso vivo
3. Equinos y Bovinos: 5,0 ml a 10,0 ml por cada 100 kg de peso vivo
4. Ovinos, Caprinos y Cerdos: 0,5 ml a 1,0 ml por cada 10 kg de peso vivo

Metadol puede ser administrado como máximo por una semana.

Presentaciones

Metadol Jarabe

1. Utilizado principalmente para perros y gatos.
2. Su forma farmacéutica líquida, hace fácil su administración y por lo tanto garantiza el éxito del tratamiento prescrito por el Médico Veterinario.
3. El contenido de 50 ml permite hasta 10 dosificaciones máximas de 5,0 ml
4. Dosis reducidas.
5. En el caso de la administración a gatos, se sugiere la administración de agua inmediatamente después de la administración del medicamento para reducir o evitar un posible aumento de la salivación.

Metadol Inyectable

1. Debido a su rapidez y potencia de acción es Ideal para casos de dolor agudo que pudieran terminar en shock.
2. Presentación: Frasco ampolla de 100 ml.



METADOL JARABE

ANALGESICO – ANTIPIRETICO –
ANTIINFLAMATORIO

COMPOSICION: Metamizol sódico, 25,00 g; Vehículo, c.s.p. 100,00 ml.

INDICACIONES: Analgésico y antipirético con moderada acción antiinflamatoria para combatir la fiebre y estados dolorosos del aparato locomotor como artritis agudas y crónicas, reumatismo de músculos y articulaciones, teno-sinovitis; neuritis, neuralgias, dolores post-operatorios; cólicos y otros estados espasmódicos de los órganos abdominales en PERROS y GATOS.

DOSIFICACION: Vía oral. Dosis: 0,2 ml/kg PV. La dosis puede ser repetida a intervalos de 8 hasta 24 horas según el caso y la respuesta del animal. Dosis máxima por animal y por administración: 5,0 ml. Duración del tratamiento: a criterio del Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES: No administrar el producto conjuntamente a barbitúricos o fenilbutazona o clorpromazina.

ADVERTENCIAS: Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACION: Mantener los envases cerrados, en lugar fresco y al abrigo de la luz.



50 ml

METADOL INYECTABLE

ANALGESICO-ANTIPIRETICO-ANTIINFLAMATORIO

COMPOSICION: Metamizol sódico, 50,00 g; Vehículo, c.s.p. 100,00 ml.

INDICACIONES: Analgésico y antipirético con moderada acción antiinflamatoria para combatir la fiebre y estados dolorosos del aparato locomotor como artritis agudas y crónicas, reumatismo de músculos y articulaciones, teno-sinovitis; neuritis, neuralgias; dolores de parto y post-operatorios; obstrucción esofágica por cuerpos extraños; cólicos, dilatación gástrica aguda y otros estados espasmódicos de los órganos abdominales, especialmente en caballos; como coadyuvante (conjuntamente al suero anti-tetánico) contra el tétano.

DOSIFICACION: Vías IM, SC ó IV lenta. Dosis: EQUINOS y BOVINOS, 5,0-10,0 ml/100 kg PV; CERDOS, OVINOS y CAPRINOS, 0,5-1,0 ml/10 kg PV; PERROS y GATOS, 0,05-0,1 ml/kg PV. La dosis puede ser repetida a intervalos de 8 hasta 24 horas según el caso y la respuesta del animal. Duración del tratamiento: a criterio del Médico Veterinario.


CONTRAINDICACIONES: No administrar el producto conjuntamente a barbitúricos o fenilbutazona o clorpromazina.

ADVERTENCIAS: Tiempos de retiro: leche, 2 días; carne, 9 días después de la administración IV y 15 días después de la administración IM ó SC. Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACION: Mantener los envases cerrados, en lugar fresco y al abrigo de la luz.



100 ml



Dr. Pet

Consulte Siempre
a Su Médico Veterinario

Fabricado y Distribuido por
LABORATORIO SILVESTRI C.A. R.I.F.: J-30631924-7
Turmero, Estado Aragua, República Bolivariana de Venezuela.
Telf.: 0244-661.00.65 / Telefax: 0244-663.22.69
E-mail: silvestrimercadeo@cantv.net.

LABORATORIO
silvestri®
Hecho por Veterinarios
J - 3 0 6 3 1 9 2 4 - 7